



Available online: <https://ijhe.tums.ac.ir>

مقاله پژوهشی



بررسی وضعیت گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان‌های شهر کاشان در سال ۹۸-۹۹

حسن رحمانی^{*}، معصومه کاظمی مشکانی، فائزه عسگری ترازوچ

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

اطلاعات مقاله:

چکیده	زمینه و هدف: بیمارستان‌ها به دلیل داشتن شرایط خاص مرکز انتقال عفونت هستند. جهت کاهش میکروارگانیسم‌ها از وسائل و محیط اطراف در بیمارستان، روش‌های ضدغونی و استریلیزاسیون مناسب نیاز است که استفاده از مواد گندزدا و ضدغونی کننده را می‌طلبد. مطالعه حاضر با هدف بررسی انواع مواد گندزدای مورد استفاده در بیمارستان‌های شهر کاشان انجام شد.	تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
		تاریخ ویرایش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
		تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
		تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

روش بررسی: روش مطالعه توصیفی-مقطوعی است. بیمارستان‌های شهر کاشان در سال ۱۳۹۸ به روش تصادفی ساده انتخاب و چک لیست مربوطه تکمیل شد. اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه با کارشناس بهداشت محیط و مشاهده بخش‌های مختلف بیمارستان و بازدید از انبار مواد گندزدا جمع آوری و تحلیل شد.	وازگان کلیدی: گندزدا، عفونت بیمارستانی، عامل بیماری زا
یافته‌ها: در بیمارستان‌های مورد بررسی با توجه به نوع خدمات و مقاومت احتمالی میکروارگانیسم‌ها از انواع خاصی مواد گندزدا استفاده می‌کنند. آب ژاول و سپایاست اچ پی بیشترین مواد گندزدای مورد استفاده بود.	

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد با توجه به اینکه عمل گندزدایی توسط پرسنل خدمات و کمک بهیاران انجام می‌شود آگاه سازی هر چه بیشتر آنها در مورد بروز و شیوع عفونت‌های بیمارستانی، اهمیت، خسارت جانی و مالی ناشی از این بیماری‌ها و نقش موثر این افراد در حذف مطلوب پاتوزن‌های محیطی و به دنباله آن کاهش عفونت‌های بیمارستانی لازم است.

پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
hs.rahmani@yahoo.com

Please cite this article as: Rahmani H, Kazemi Mashkani M, Asgari Tarazoj F. Investigation of the status of disinfectants used in hospitals in Kashan in 2019-2020. Iranian Journal of Health and Environment. 2021;14(3):447-60.

مقدمه

قرار می‌گیرند و این شامل الكل‌ها، گلوتارآلدئید، هیپوکلریت سدیم، ترکیبات فنلی، ترکیبات آمونیوم کواترنر، کلرهگزیدین و پراکسیدها است (۱۵-۱۷). در هنگام انتخاب یک ماده گندزدا داشتن حداکثر کارایی و حداقل خطر انتقال عفونت و فساد محصولات شرط اصلی است. از عوامل موثر در فعالیت یک ماده گندزدا غلظت، زمان تماس و دما است. یک ماده گندزدایی ایده آل باید در حداقل غلظت، در کوتاه‌ترین زمان و در دمای معمول اتاق بهترین اثر را داشته باشد. همچنین محصولات گندزدا باید استفاده آسان، موثر با عملکرد سریع، پایدار، غیر سمی، بدون بو، با اثر طولانی مدت، تجزیه پذیر، تضمین کننده امنیت کاربر و باید در سطوح تصفیه شده مناسب باشند (۴، ۵).

گندزداهای با انعقاد پروتئین باکتری‌ها، از بین بردن غشای سلول آن یا با حذف یک گروه سولفون از موجودات باعث حواس پرتی می‌شوند. همچنین براساس و نحوه عملکرد گندزداهای با تخریب پروتئین‌ها، لیپیدها یا اسیدهای نوکلئیک در سلول‌ها یا غشای سیتوپلاسمی آن در ارتباط هستند (۱۸). برخی از گندزداهای دیوارهای سلولی میکروارگانیسم‌ها را سوراخ می‌کنند، اجازه می‌دهد تا محتوای آنها نشت کند، در حالی که برخی دیگر نفوذ می‌کنند و وارد سلول می‌شوند و میکروارگانیسم را از درون تخریب می‌کنند (۱۷). در بیمارستان‌ها جهت گندزدایی سطح بالا از ترکیبات موثر بر روی باسیل سل، باکتری، قارچ، ویروس‌های بدون پوشش و پوشش دار مانند گلوتارآلدئید و هیدروژن پراکسید استفاده می‌شود (۱۹). در گندزدایی سطح متوسط با استفاده از موادی چون ترکیبات الكلی و کلردار حذف باسیل سل، باکتری، قارچ و بعضی ویروس‌ها انجام می‌گیرد ولی الزاماً به حذف همه ویروس‌ها یا اسپورها نیست. گندزداهای سطح پایین مانند ترکیبات فنل و آمونیوم قادر به از بین بردن اسپور باکتری و باسیل سل نبوده و تنها بعضی از باکتری‌ها و قارچ‌ها و ویروس‌ها را از بین می‌برد (۴). گندزدایی و آگاهی از ماهیت گندزدا و فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی آن نقش کلیدی در موفقیت یک گندزدایی یا استریلیزاسیون دارد. متأسفانه در بسیاری از مواقع انتخاب نامناسب گندزداهای فیزیک نامناسب محیط، عدم آموزش و ناآگاهی پرسنل، سبب کاهش تاثیر گندزداها شده که به حذف نامطلوب پاتوژن‌های محیطی

افزايش عفونت‌های بیمارستانی یکی از مشکلات مراکز بهداشتی درمانی در سراسر جهان، به ویژه ایران است. بیمارستان‌ها در حال حاضر با عفونت‌های مختلف مواجه هستند و این عوامل بیماری زا می‌توانند هفتنه را روی سطوح باقی بمانند (۱، ۲).

عفونت‌های بیمارستانی توزیع اپیدمیولوژیکی گسترده‌ای دارند و با افزایش میزان مرگ و میر همراه هستند. بیمارستان‌ها موظف به حفظ بهداشت و اقدامات مناسب گندزدایی هستند تا محیط مناسبی را برای بیماران، ویزیتورها و کارمندان بیمارستان فراهم کنند (۳، ۴). چندین میکروارگانیسم شامل اشريشياکلى، كلستريديوم ديفيسيل، استافيلوكوكوس اورئوس، سودomonas آئروژينوزا، مايكوباكتريوم، سل معمولاً در بیمارستان‌ها یافت می‌شوند که این نوع میکروارگانیسم‌ها مسئول عفونت‌های بیمارستانی هستند و سالانه هزینه‌های زيادي را برای مراقبت‌های بهداشتی ایجاد می‌کنند (۵، ۶).

بنابراین، اهمیت روزمره بهداشت و در نتیجه استفاده از مواد ضد عفونی کننده و گندزداها در زندگی روزمره بشریت افزایش می‌باید. از مواد ضد عفونی کننده و گندزداها در بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی به منظور کنترل رشد میکروب‌ها در بافت‌های زنده و اجسام بی جان بسیار استفاده می‌شود (۷، ۸). گندزدایی یک روش کارآمد برای از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری زا بوده و استفاده موثر از مواد گندزدا یک عامل اصلی در پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی است (۹، ۱۰). گندزدایی موثر، مانند گندزدایی شيميايی، گرما و اشعه ماوراء بنفش و ...، نقشی اساسی در جلوگیری از آلودگی و گسترش عفونت‌ها و عوامل بیماری زا دارد (۱۱، ۱۲). در بیمارستان‌ها، هر روزه از گندزداها برای گندزدایی دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های آندوسکوپی، وسائل جراحی، پانسمان زخم، اتاق‌های عمل و زایمان، بخش سوختگی و ICU و CCU استفاده می‌شود. آنها همچنین برای گندزدایی راهروها و سطوح فيزيكى بیمارستان‌ها استفاده می‌شوند. يکی از روش‌های گندزدایی استفاده از مواد شيميايی گندزداست (۱۳، ۱۴). طيف گستره‌های از مواد شيميايی به عنوان گندزدا در محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی مورد استفاده

یافته‌ها

یافته‌های این مطالعه نشان داد که بیمارستان‌های مورد مطالعه بیشتر (حدود ۷۰ درصد) از گندزداهای تولید شده در داخل کشور استفاده می‌کردند و مابقی گندزداهای مورد استفاده، در زمان انجام مطالعه وارداتی بود (جدول ۱). در تمام بیمارستان‌های کمیته کنترل عفونت وجود دارد که مسئولیت اصلی انتخاب گندزدای موثر و مناسب، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنترل عفونت‌های بیمارستانی بر عهده کارشناس بهداشت محیط است. دوره‌های آموزشی حضوری توسط کارشناس بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان‌های تحت مطالعه برای گروه‌های هدف از جمله خدمات، کمک بهیاران، پرستاران، دانشجویان و نیروهای جدید الورود صورت می‌گیرد و علاوه بر آن فایل آموزشی غیر حضوری نیز در سامانه اینترنتی هر بیمارستان وجود دارد. در برنامه کاری سالانه هر بیمارستان در راستای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در بخش‌های مختلف هر بیمارستان، برگزاری دوره‌های آموزشی که حداقل دو دوره و حداقل چهار دوره در سال است در نظر گرفته شده است. کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان‌های مورد مطالعه بر این عقیده بودند که پرسنل تمایل زیادی برای شرکت در این دوره‌های آموزشی ندارند اما به علت آزمون‌های علمی که ضمن سنجش یادگیری پرسنل گرفته می‌شود و همچنین درج در پرونده‌ها پرسنل، ملزم به شرکت در این دوره‌ها می‌شوند. در این دوره‌ها برای پرسنل خدماتی که درگیر با مواد گندزدا هستند مباحثی مانند آشنازی با مواد گندزدا و ضدعفونی کننده، نحوه ترقیق و استفاده از مواد گندزدا، موارد ایمنی و هشدار مواد گندزدا، لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی ضمن کار، خطرات احتمالی در صورت استفاده نامناسب از مواد گندزدا، برنامه جهت گندزدایی بخش‌های مختلف خدماتی ارائه می‌شود. در بیمارستان‌های مورد بررسی پرسنل خدماتی از وسایل حفاظت فردی ضمن کار استفاده می‌کردند که نشان دهنده تاثیر دوره‌های آموزشی بود. در بیشتر بیمارستان‌های مورد بررسی علاوه بر برنامه روتین روزانه برای گندزدایی، برنامه شستشوی آخر هر هفته هم برای سطوح و محیط صورت می‌گیرد. در این تحقیق بازدید از انبار مواد گندزدا انجام شده

و در نهایت افزایش احتمال ایجاد عفونت‌های بیمارستانی منجر شود (۲۰). بهره مندی از اطلاعات کافی در خصوص گندزداهای ضد عفونی کننده‌ها در امور بهداشتی دارای اهمیت فراوانی است، ولی مطالعات زیادی درخصوص گندزدایی بیمارستان‌های شهر کاشان انجام نگرفته است. بنابراین به دلیل اهمیت انتخاب نوع مناسب ماده گندزدا در پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی، این مطالعه با هدف بررسی نوع ماده‌های گندزدای مورد استفاده در بیمارستان‌های شهر کاشان انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. از بین ۷ بیمارستان موجود در شهر کاشان ۵ بیمارستان با روش نمونه گیری ساده در آذرماه ۱۳۹۸ انتخاب شدند و بیمارستان‌های انتخاب شده با کدهای ب (کد ۱)، م (کد ۲)، ی (کد ۳)، ک (کد ۴)، ن (کد ۵) نامگذاری گردیدند. بیمارستان‌های مورد بررسی از نظر وابستگی از دو نوع دولتی و خصوصی هستند. با کسب مجوز از مدیریت دانشگاه و سپس مراجعته به بخش مدیریت بیمارستان و انجام مراحل اداری و کسب اجازه، اطلاعات لازم از طریق بخش کنترل عفونت، واحد بهداشت محیط بیمارستان، انبار مواد گندزدا و ضدعفونی کننده و بازدید از قسمت‌های مختلف بیمارستان جمع آوری شد. در طی مصاحبه‌ایی که با کارشناس بهداشت محیط در واحد کنترل عفونت و بهداشت بیمارستان انجام شد اطلاعات لازم در مورد گندزداهای کاربردی در مورد قسمت‌های مختلف محیط بیمارستان و تجهیزات مورد استفاده کسب گردید که شامل سطوح فلزی (نرده‌ها)، سطوح غیرفلزی (کف و دیوار)، سطوح و لوازم آشپزخانه، اتاق عمل، تخت اتاق عمل، بخش ای سی یو، سرویس بهداشتی، آندوسکوب و کولونوسکوب، وسایل جراحی بیوپسی، ملافه و البسه، تجهیزات پزشکی (تب سنج و گوشی پزشکی)، ظروف آزمایشگاهی، تجهیزات الکترونیکی و دیالیز، ترالی پانسمان و دارو، ابزار بیهوشی و تجهیزات تنفسی می‌شود (ضمائمه). در پایان نیز نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل مورد جمع بندی قرار گرفت و در جهت گزارش نهایی تنظیم گردید.

رجوع بدون حضور و سخت گیری کارشناس مربوطه به نحو مطلوب صورت نمی‌گیرد. ضدغونی و استریلیزاسیون دستگاهها و تجهیزات و ابزار پزشکی بر طبق دستورالعمل خاص خود در هر بخش راهبری می‌شود.

که وضعیت انبار از لحاظ پالت بندی، رطوبت سنج، دماسنجد و تهویه در جدول ۲ آورده شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، انجام گندزدایی باید به صورت ۳ بار در روز صورت گیرد که این عمل در بیمارستان‌های بزرگ با تعداد بالای ارباب

جدول ۱- مواد گندزدایی مورد استفاده در بیمارستان‌های تحت مطالعه

ن (کد ۵)	ک (کد ۴)	ی (کد ۳)	م (کد ۲)	ب (کد ۱)	س طوح و تجهیزات بیمارستان
ساپاپت اچ بی	سپتی سورفیس	سارفوپت ۲	سارفوپت ۲	ساپاپت اچ بی	سطوح فلزی
دکونکس ۲AF%	ساپاپت اچ بی وایتكس ۲ درصد	ساپاپت اچ بی وایتكس ۲ درصد	آب ژاول ۲ درصد	ساپاپت اچ بی	کف و دیوار
وایتكس ۱ درصد	وایتكس ۱ درصد	وایتكس ۱ درصد	آب ژاول ۲ درصد	آب ژاول ۱ درصد	سروریس بهداشتی
وایتكس ۱ درصد	وایتكس ۱ درصد	وایتكس ۱ درصد	اسید سیتریک و وایتكس ۱ درصد	اسپری اچ بی ساپاپت	سطوح آشپزخانه
آب داغ و دترجنت	آب داغ و دترجنت	آب داغ و دترجنت	آب داغ و دترجنت	آب داغ و دترجنت	لوازم آشپزخانه
دکونکس ۵۰ ۲AF%	-*	سارفوپت ۲	سارفوپت ۲	ساپاپت اچ بی	سطوح اتاق عمل
دکونکس ۳۰ پالس ۲ درصد	-	سارفوپت ۲	سارفوپت ۲	ساپاپت اچ آی	تحت اتاق عمل
ساپاپت اچ بی	-	سارفوپت ۲	سارفوپت ۲	ساپاپت اچ آی	بخش ICU
گلوتارآلدئید	-	ساپاپت اچ بی	ساپاپت اچ آی	وبوی ساید	آندوسکوب و کولونوسکوب
شستشو گندزدایی با گلوتار آلدئید	-	پلاسما کردن و استریلیزاسیون در اتوکلاو	اینسترومیت فورته	گندزدایی با ساپاپت اچ آی و استریلیزاسیون در اتوکلاو	وسایل جراحی بیوپسی
استریلیزاسیون در اتوکلاو	-	گندزدایی با وایتكس	استریلیزاسیون در اتوکلاو	گندزدایی با ساپاپت اچ آی و استریلیزاسیون در اتوکلاو	طروف آزمایشگاهی
آب ژاول	آب ژاول	آب ژاول	آب ژاول	آب ژاول	مالفة و الیسه
استریلیزاسیون در اتوکلاو	استریلیزاسیون در اتوکلاو	گندزدایی با وایتكس	استریلیزاسیون در اتوکلاو	گندزدایی با ساپاپت اچ آی و استریلیزاسیون در اتوکلاو	فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران ijhe.tums.ac.ir

ادامه جدول ۱- مواد گندزدای مورد استفاده در بیمارستان‌های تحت مطالعه

ن (کد ۵)	ک (کد ۴)	ی (کد ۳)	م (کد ۲)	ب (کد ۱)	بیمارستان سطوح و تجهیزات
53plus2% دکونکس	-	محلول فرم	اسپری آنسوس	ونتی سپت G	تجهیزات الکترونیکی و دیالیز
الکل ۷۰ درصد	سبتی سورفیس	الکل ۷۰ درصد	الکل ۷۰ درصد	الکل ۷۰ درصد	تب سنج و گوشی پزشکی
اسپری سپت اچ بی	سایاپست اچ بی	سارفوپست ۲	سارفوپست ۲	سبتی سورفیس	ترالی پانسمان و دارو
ساپتی اچ بی	-	ساپتی اچ بی	اینسترومانت فورته	ساپتی اچ بی	ابزار بیهوشی
گلوتارآلدئید	-	اینسترومانت فورته	اینسترومانت فورته	ساپتی اچ آی	تجهیزات تنفسی
تولید داخل و وارداتی	تولید داخل	تولید داخل	تولید داخل و وارداتی	تولید داخل و وارداتی	نوع محصول


* قسمت‌های عالمت‌دار مربوط به بیمارستان فوق الذکر بدلیل اینکه مرکز روان درمانی است قادر بخش‌های ذکر شده است و در نتیجه ماده گندزدای مربوط به آن بخش است.

جدول ۲- وضعیت انبار مواد گندزدای مورد استفاده در بیمارستان‌های مورد مطالعه

کد ۱ ب	نام	دماسنچ	روطوبت سنج	پالت بندی	تهویه	چیدمان مواد	وضعیت انبار	بیمارستان
کد ۲ م	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب
کد ۳ ی	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب
کد ۴ ک	نامطلوب	نامطلوب	نامطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب
کد ۵ ن	نامطلوب	نامطلوب	نامطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب

نیاز برای هر بخش به صورت ماهانه از انبار تهیه و در اتاق‌های ویژه‌ایی در بخش‌ها نگهداری می‌شوند که در بیمارستان‌های مورد بررسی در اکثر موارد وضعیت اتاق از لحاظ تهیه و چیدمان مواد نامطلوب بود.

در این بررسی بازدید از انبار مواد گندزدا و ضدغوفونی کننده نشان داد، وضعیت انبار از لحاظ تهیه، دماستج، پالت بندی و چیدمان مواد در اغلب بیمارستان‌ها به نحو مطلوب و از لحاظ رطوبت سنج در زمان بازدید نامطلوب بود. گندزداهای مورد



نمودار ۱- درصد فراوانی مواد گندزدایی مورد استفاده در بیمارستان‌های مورد مطالعه

گوانیدی است که این مواد سبب گستره عملکردی وسیع در این گندزدا شده است. سارفوسپت دارای مواد موثره‌ایی شامل الکیل آمین فعال شده با کلرو استیک اسید و ایزوپروپانول است که بر روی باکتری، قارچ، کپک، ویروس‌های پوشش دار مانند HINI، HCV، HBV، HIV موثر است.

بحث

امروزه با توجه به کارگیری روش‌های مختلف در زمینه کنترل عفونت‌های بیمارستانی، به علت مقاومت میکروبی بوجود آمده در برابر عوامل ضدمیکروبی شیمیایی، هنوز در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها، شاهد مبتلا شدن افراد حساس و آسیب پذیر به عفونت‌های بیمارستانی هستیم (۲۱). در گذشته تصور می‌شد سطوح محیطی نقش ناچیزی در انتقال عفونت‌های بیمارستانی

همانگونه که در نمودار ۱ قابل مشاهده است در بیمارستان‌های مورد مطالعه در اغلب موارد برای گندزدایی سطوح و لوازمی که نیاز به گندزدایی سطح متوسط و پایین دارند از غلظت‌های مختلف وایتکس و الكل ۷۰ درصد استفاده می‌شود از این مواد گندزدا در مواردی که نیاز به پاک کردن است اما به دلیل شرایط خاص گندزدایی لازم است استفاده می‌شود. این مواد بر روی قارچ، باکتری، بعضی ویروس‌ها اثر دارند اما روی اسپورها موثر نیستند. هیپوکلریت سدیم (وایتکس یا آب ژاول) موجود در ایران، حاوی ۵۰۰۰ ppm کلر قابل دسترس بوده، ماده‌ایی ارزان، سریع العمل و دارای طیف اثر زیاد است. در بین سایر مواد گندزدا سایاپیت اچ پی و سارفوسپت بیشترین درصد را دارند که سایاپیت، فاقد آلدئید، فنل و هالوژن‌ها بوده و بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی نسل پنجم و ترکیبات بی

یک ماده گندزدا به همراه تعیین غلظت بهینه جهت تاثیر بر میکروارگانیسم‌ها را می‌طلبد (۲۵).

Beirami و همکاران در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی عملکرد مرکز استریل بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز عمدترين نقش را در نبود وسایل حمل و نقل مناسب پكها در بیمارستان‌ها و نبود امکانات و محل لازم برای شستشو و ضدعفونی تخت بیان می‌کند. Angola و همکاران در بررسی ۵۰ ۲۲ بیمارستان مکزیک در سال ۱۹۹۵ مشاهده کردند که تا ۹۴ درصد بیمارستان‌ها از روش‌های نامناسب گندزدایی و استریل سازی استفاده می‌کردند (۲۶).

از بین ۴ بیمارستان مورد مطالعه غیر از بیمارستان کد ۴ که مرکز روان درمانی است و فاقد آندوسکوپ و کولونوسکوپ است، ۲ بیمارستان جهت ضدعفونی آندوسکوپ و کولونوسکوپ از ترکیبات بر پایه گلوتارآلدئید استفاده کرده و از بین ۴ بیمارستان مورد بررسی غیر از بیمارستان کد ۴ که فاقد تجهیزات تنفسی و بیهوشی است در ۳ بیمارستان جهت ضدعفونی از گندزداهایی بر پایه گلوتارآلدئید و آمونیوم چهارظرفیتی برای تجهیزات تنفسی و ابزار بیهوشی استفاده می‌شود. تجهیزاتی مانند آندوسکوپ و کولونوسکوپ به دلیل ورود به داخل سیستم عروقی یا بافت‌های استریل، در دسته حیاتی و ابزار بیهوشی و تجهیزات تنفسی در دسته نیمه حیاتی قرار دارند و در تمامی بیمارستان‌ها برای ضدعفونی و گندزدایی این تجهیزات از گندزداهایی که طیف عملکردی وسیعی بر روی میکروارگانیسم‌ها دارند، استفاده شده است و به این امر مهم توجه شده است و همچنین نتایج بررسی حاضر نشان داد که ساختار مشخصی برای کنترل عفونت در بیمارستان‌های مورد مطالعه وجود دارد که بهداشت محیط بیمارستان و واحد کنترل عفونت در این خصوص فعالیت دارند و برنامه گندزدایی هر بخش به وسیله کارشناسان بهداشت محیط و کنترل عفونت و با نظارت و موافقت سرپرستار همان بخش تنظیم می‌شود. براساس تحقیقات بهدست آمده در این مطالعه در بخش‌هایی از بیمارستان نظیر اتاق عمل که در آن پروسیجرهای درمانی انجام می‌شود، تست‌ها و کنترل کیفی خاص مثل انجام نمونه گیری و کشت از محیط، ابزار و تجهیزات انجام می‌شود تا

دارند اما بررسی‌های اخیر حاکی آن است که سطوح آلوده نقش مهمی در انتقال آندمیک و اپیدمیک پاتوژن‌های خاصی دارند که عامل عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی هستند (۲۲). سطوح به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: سطوح پر تماس که تماس دست با آنها زیاد است و در بیمارستان شامل دستگیره در، تخت‌های متحرک، لبه پرده‌ها، دیوارهای اطراف دستشویی، میز رایانه، میز کنار تخت و سطوح کم تماس که دست با آنها تماس کمتری دارد سقف و کف اتاق است. سطوح در مجاور بیماران دارای فرکانس بالاتری از آلودگی نسبت به سایر نقاط هستند و نمونه برداری از این سطوح نشان دهنده وجود پاتوژن‌های بیماری زا بوده است. مطالعات میکروبیولوژیک ثابت کرده است که پاتوژن‌های خاصی در سطوح خشک بیمارستان به مدت طولانی باقی می‌مانند (۲۳).

انتقال پاتوژن از سطوح محیطی به دست و بر عکس اتفاق می‌افتد و احتمال اینکه آلودگی اکتسابی از محیط مدت زمان طولانی باقی بماند بیشتر است بنابراین، این نوع آلودگی برای انتقال مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد (۲۴). لذا تمیز کردن و سپس گندزدایی روزانه یا چند بار در روز به منظور کاهش بار آلودگی محیطی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود محیط اطراف بیمار تمیز باقی می‌ماند. انجام تست محلول‌های گندزدایی مورد استفاده جزء اساسی در نظارت بر گندزدایی است. نتایج این تست‌ها، غلظت‌های توصیه شده برای استفاده تحت شرایط کنترل شده است البته که شرایط واقعی به علت خطاهای انسانی و موارد غیرمنتظره هرگز قابل کنترل نیست و این امر امکان بقا و تکثیر میکروب‌ها را فراهم می‌کند (۲۴). از آنجایی که عوامل شیمیایی مختلف بر روی سطوح و مواد مختلف اثرات گوناگونی دارند باید انتخاب ماده گندزدا براساس خصوصیات معینی باشد و توجه شود که عوامل شیمیایی زمانی بر میکروارگانیسم‌ها اثر می‌کنند که در تماس نزدیک با آنها باشند و بتوانند آنها را غیر فعال کنند بدیهی است که وجود مواد دیگر در محیط که به سادگی قابل جذب است می‌تواند از این تماس جلوگیری کند. وجود طیف وسیع عوامل موثر در ایجاد عفونت و با توجه به تاثیر محیط‌های مختلف و آلاینده‌های آنها، مطالعات مناسب در جهت انتخاب و کاربرد

فهم گنجانده شود. از آنجا که به کارگیری درست از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده‌های استفاده شده تعیین شود و در سایر قسمت‌های بیمارستان کنترل کیفی خاصی صورت نمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر که به منظور بررسی نوع مواد گندزدای شهر کاشان انجام گرفت نشان داد که درخصوص نوع مواد گندزدای به کارگرفته شده رویه خاص و واحدی وجود ندارد بلکه هر بیمارستان براساس رویکرد خود از مواد گندزدای مختلفی برای گندزدایی‌های لازم بهره می‌گیرد. البته شایان ذکر است که تعدادی از کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان، معتقدند که بهتر است از انواع کمتری از مواد گندزدا با طیف اثر وسیع استفاده شود تا برای پرسنل خدماتی از لحاظ نحوه صحیح و مناسب استفاده از این مواد، حتی با توجه به آموزش‌های لازم و آزمون‌ها مشکلی بوجود نیاید. با توجه به کمبودهای مشاهده شده در طی این بررسی و همچنین به دلیل اهمیت آموزش در جهت اجرای صحیح اصول پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، علاوه بر دوره‌های آموزشی مداوم درخصوص ویژگی‌های مواد گندزدا و نحوه به کارگیری آنها و لزوم رعایت اینمنی در طی کار با این مواد، آگاه سازی هر چه بیشتر پرسنل درگیر در مورد بروز و شیوع عفونت‌های بیمارستانی، خطرات، خسارت‌های جانی و مالی ناشی از این بیماری و سهم بسیار موثر این افراد خدماتی در کنترل این عفونت‌های بیمارستانی لازم است در این برنامه‌های آموزشی با زبان ساده، گویا، قابل

ملاحظات اخلاقی

نویسنده‌گان کلیه نکات اخلاقی شامل رضایت آگاهانه، عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده‌ها و داده‌سازی را در این مقاله رعایت کردند.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی وضعیت گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان‌های شهر کاشان" مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در سال ۱۳۹۹ با کد IR.KAUMS.REC.1399.031 از IR.KAUMS.REC.1399.031 است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان اجرا شده است.

ضمائمه

فرم جمع آوری داده

فرد مورد مطالعه:

تاریخ بررسی:

رشته تحصیلی فرد:

مدرک تحصیلی فرد:

نام بیمارستان:

سابقه کاری فرد:

آیا در یک سال گذشته دوره آموزشی (نحوه استفاده از مواد گندزدا، رعایت موارد ایمنی...) اجرا شده است؟
در صورت مثبت بودن چندبار در سال خیر بلی

آیا در یک سال گذشته پرسنل مسئول گندزدایی بیمارستان آزمون علمی (جهت تأکید بیشتر بر دانش، توانایی، مهارت در مصرف سوم و گندزدا....) گذرانده است؟
در صورت مثبت بودن چندبار در سال خیر بلی

تعداد پرسنل شاغل در امور گندزدایی هنگام کار با مواد گندزدا که از چکمه استفاده می‌کنند نفر از کل پرسنل

تعداد پرسنل شاغل در امور گندزدایی هنگام کار با مواد گندزدا که از دستکش استفاده می‌کنند نفر از کل پرسنل

تعداد پرسنل شاغل در امور گندزدایی هنگام کار با مواد گندزدا که از لباس مخصوص استفاده می‌کنند نفر از کل پرسنل

آیا انبار گندزدایی در این بیمارستان وجود دارد:
در صورت مثبت بودن پاسخ خیر بلی

ندارد	دارد		وضعیت انبار
	نامطلوب	مطلوب	
			پالت بندی
			رطوبت سنج
			دماسنچ
			وضعیت تهویه
			چیدمان مواد به شکل صحیح

اطلاعات مربوط به مواد گندزدای بیمارستان‌های مورد مطالعه

درصد مصرفی گندزا	توالی استفاده از گندزا	نوع ماده گندزا	سطوح گندزدایی شونده
۲-۱ درصد	روزانه	HP ساپایاست	سطوح فلزی
۲ درصد	روزانه	AF50 دکونکس	
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	سپتی سورفیس	
۲-۱ درصد	روزانه	آب ژاول	کف و دیوار
۲ درصد	روزانه	AF50 دکونکس	
۲-۱ درصد	روزانه	HP ساپایاست	
۲-۱ درصد	روزانه	آب ژاول	سرویس بهداشتی
آماده به مصرف	روزانه	جوهر نمک	
۲ درصد	روزانه	AF50 دکونکس	
آماده به مصرف	روزانه	اسید سیتریک	سطوح آشپزخانه
۲-۱ درصد	روزانه	آب ژاول	
۲-۱ درصد	روزانه	HP ساپایاست	
به مقدار نیاز	روزانه	آب داغ و دترجنت	لوازم آشپزخانه
۱ درصد	در صورت نیاز	سارفوپت ۲	سطوح اتاق عمل
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	سپتی سورفیس	
آماده به مصرف (۷۰ درصد)	در صورت نیاز	الکل	
۲-۱ درصد	روزانه	HP ساپایاست	تحت اتاق عمل
۱ درصد	بعد از هر بار استفاده از اتاق عمل	سارفوپت ۲	
۲ درصد	روزانه	AF50 دکونکس	
آماده به مصرف	در صورت نیاز	سپتی سورفیس	بخش ICU
۲-۱ درصد	روزانه	HP ساپایاست	
۲-۱ درصد	روزانه	HP ساپایاست	
۱ درصد	روزانه	سارفوپت ۲	آندوسکوب و کولونوسکوب
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	اپی مکس پلاس	
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	ویوی ساید	
۲ درصد	هفتگی	Plus 53 دکونکس	

ادامه اطلاعات مربوط به مواد گندزدای بیمارستان‌های مورد مطالعه

درصد مصرفی گندزدا	توالی استفاده از گندزدا	نوع ماده گندزدا	سطح گندزدایی شونده
۲-۱ درصد	روزانه	آب ژاول	ملافه و البسه
آماده به مصرف (۷۰ درصد)	روزانه	الكل	تجهیزات الکترونیکی و دیالیز
۲ درصد	هفتگی	دکونکس ۵۳	
۲-۱ درصد	روزانه	سپاپایاست HP	ابزار بیهوشی
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	اپی مکس پلاس	
۲ درصد	پس از هر بار استفاده	استرومانت فورته	
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	سپاپایاست HI	تجهیزات تنفسی
۲-۱ درصد	در صورت نیاز	اپی مکس پلاس	

References

1. Dancer SJ, Kramer A. Four steps to clean hospitals: LOOK, PLAN, CLEAN and DRY. *Journal of Hospital Infection*. 2019;103(1):e1-e8.
2. Nourbakhsh F. Efficacy of Disinfectants on Bacteria; Case Study of Isfahan Hospitals. *International Archives of Health Sciences*. 2016;3(4):189-94.
3. da Silva Aquino I, Porto JCS, da Silva JL, Morais KFC, Coelho FA, de Sousa Lopes T, et al. Evaluation of disinfectants for elimination of fungal contamination of patient beds in a reference hospital in Piauí, Brazil. *Environmental Monitoring and Assessment*. 2016;188(11):644.
4. Mosaferi M, Firouzi P, Bargar M. Investigating all kinds of disinfectants used in Tabriz hospitals. *Depiction of Health*. 2017;8(3):177-85.
5. Mireles L-K, Dayan J, Massicotte R, Dagher F, Yahia LH. Interactions of active compounds of disinfectants on metallic and polymeric hospital surfaces. *Clinical and Medical Investigations*. 2016;1(2):39-47.
6. Cadnum JL, Shaikh AA, Piedrahita CT, Sankar T, Jencson AL, Larkin EL, et al. Effectiveness of disinfectants against *Candida auris* and other *Candida* species. *Infection Control & Hospital Epidemiology*. 2017;38(10):1240-43.
7. Chavhan A. Efficacy study of some antiseptics and disinfectants. *International Journal of Life Sciences*. 2017;5(4):593-98.
8. Rashid T, Haghghi F, Hasan I, Bassères E, Alam MJ, Sharma SV, et al. Activity of hospital disinfectants against vegetative cells and spores of *Clostridioides difficile* embedded in biofilms. *Antimicrobial Agents and chemotherapy*. 2019;64(1):1-10.
9. Keshavarz-Hedayati S, Shapouri R, Habibollah-Pourzereshki N, Bigverdi R, Peymani A. Molecular investigation of resistance to disinfectants in *Acinetobacter baumannii* isolates collected from Qazvin hospitals, Iran (2017). *The Journal of Qazvin University of Medical Sciences*. 2019;23(1):2-13 (in Persian).
10. Nabi G, Wang Y, Hao Y, Khan S, Wu Y, Li D. Massive use of disinfectants against COVID-19 poses potential risks to urban wildlife. *Environmental Research*. 2020;188:109916.
11. Song X, Vossebein L, Zille A. Efficacy of disinfectant-impregnated wipes used for surface disinfection in hospitals: a review. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*. 2019;8(1):139.
12. Sassi HP, Reynolds KA, Pepper IL, Gerba CP. Evaluation of hospital-grade disinfectants on viral deposition on surfaces after toilet flushing. *American Journal of Infection Control*. 2018;46(5):507-11.
13. Mokhtari M, Zandi H, Jasmi Zad T, Sahl Abadi F, Montazari A. The evaluation of efficacy of common disinfectants on microorganisms isolated from different parts of Shahid Sadoughi Accidents burns hospital in Yazd in 2011. *Toloobehdasht*. 2015;14(3):1-11 (in Persian).
14. Pirsahab M, Salari M, Pourhaghhighat S, Sharifi K. The comparison of the effectiveness of newly market disinfectants with com-monly used disinfectants in iran in reducing hospital infections index-a case study: Kermanshah hospitals (2015). *Acta Medica Mediterranea*. 2016;32:967-71.
15. Obi C, Muhammad U, Manga S, Atata R, Hauwa T. Assessment of commonly used hospital disinfectants on bacteria isolated from the operating theatre. *Journal of Bioscience and Biotechnology Discovery*. 2016;1:59-65.
16. Boyce JM. Alcohols as surface disinfectants in healthcare settings. *infection control & hospital epidemiology*. 2018;39(3):323-28.
17. Chinedu M, Stephen O, Uchenna U. Comparative

- studies of the efficacy of some disinfectants on human pathogens. Global Journal of Medicine Researches and Studies. 2014;1(4):103-10.
18. Basavegowda N, Baek K-H. Synergistic antioxidant and antibacterial advantages of essential oils for food packaging applications. Biomolecules. 2021;11(9):1267.
19. De Groote MA, Gibbs S, de Moura VCN, Burgess W, Richardson K, Kasperbauer S, et al. Analysis of a panel of rapidly growing mycobacteria for resistance to aldehyde-based disinfectants. American Journal of Infection Control. 2014;34-42(8):932-34.
20. Zazouli MA, Homayoun nasab Langroodi M, Ahanjan M, Yazdani Cherati J, Islamifar M. Efficiency of some disinfectants (Cidex, Deconex, and Creolin) against E. Coli. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;24(122):137-46 (in Persian).
21. Rutala WA, Weber DJ. Monitoring and improving the effectiveness of surface cleaning and disinfection. American Journal of Infection Control. 2016;44(5):e69-e76.
22. Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R. Burn wound infections. Clinical Microbiology Reviews. 2006;19(2):403-34.
23. Wagenvoort J, De Brauwer E, Penders R, Willems R, Top J, Bonten M. Environmental survival of vancomycin-resistant Enterococcus faecium. Journal of Hospital Infection. 2011;77(3):282-83.
24. Goldenberg S, Patel A, Tucker D, French G. Lack of enhanced effect of a chlorine dioxide-based cleaning regimen on environmental contamination with Clostridium difficile spores. Journal of Hospital Infection. 2012;82(1):64-67.
25. Zhang A, Nerandzic MM, Kundrapu S, Donskey CJ. Does organic material on hospital surfaces reduce the effectiveness of hypochlorite and UV radiation for disinfection of Clostridium difficile? Infection Control & Hospital Epidemiology. 2013;34(10):1106-108.
26. Khamirchi R, Rezaei GAZ, Yaghobi FMA, Rakhsani MH. Quality control of sterilization in the hospitals of Sabzevar in 2014. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2017;24(4):233-37.



Available online: <https://ijhe.tums.ac.ir>

Original Article



Investigation of the status of disinfectants used in hospitals in Kashan in 2019-2020

Hasan Rahmani*, Masoumeh Kazemi Mashkani, Faezeh Asgari Tarazoj

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

ARTICLE INFORMATION:

Received: 4 September 2021

Revised: 24 November 2021

Accepted: 27 November 2021

Published: 21 December 2021

ABSTRACT

Background and Objective: Hospitals are the center of infection transmission due to their special conditions. In order to reduce microorganisms from the equipment and in the hospital environment, disinfection and sterilization methods are required. The aim of this study was to investigate the types of disinfectants used in Kashan hospitals.

Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, Kashan hospitals were selected in 2019 by simple random sampling and the relevant checklist was completed. The required information was collected and analyzed by interviewing an environmental health expert and observing different parts of the hospital and visiting the disinfectant warehouse.

Results: Due to the type of services provided and the possible resistance of the existing microorganisms, the studied hospitals use certain types of disinfectants. Bleach and sayasept -HP were the most widely used disinfectants.

Conclusion: The results showed that since the disinfection is performed by service personnel and help of health workers, informing them about the incidence and prevalence of nosocomial infections, loss of life and financial damage caused by these diseases is very important. In addition, the effective roles of these individuals in the optimal elimination of environmental pathogens and consequently the reduction of nosocomial infections are crucial.

Keywords: Disinfection, Nosocomial infection, Pathogen

*Corresponding Author:

hs.rahmani@yahoo.com

Please cite this article as: Rahmani H, Kazemi Mashkani M, Asgari Tarazoj F. Investigation of the status of disinfectants used in hospitals in Kashan in 2019-2020. *Iranian Journal of Health and Environment*. 2021;14(3):447-60.