

آنالیز کمی-کیفی و نحوه مدیریت زباله‌های لابراتوارهای دندانسازی و مطب‌های دندانپزشکی تجربی شهر همدان - سال ۱۳۸۶

علی کولیوند^۱، رامین نبی زاده^۲، احمد جنیدی جعفری^۳، مسعود یونسیان^۴، قاسمعلی عمرانی^۵

نویسنده مسئول: تهران، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مهندسی بهداشت محیط akulivand@yahoo.com

دریافت: ۸۷/۱۱/۲۷ پذیرش: ۸۸/۲/۲۹

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی، مواد زاید تولیدی در مراکز دندانپزشکی و دندانسازی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف آنالیز کمی و کیفی و نحوه مدیریت زباله‌های تولیدی در لابراتوارهای دندانسازی و دندانپزشکی تجربی شهر همدان در سال ۱۳۸۶ انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از ۲۴ لابراتوار دندانسازی موجود در شهر همدان، ۵ مرکز و از ۲۷ مطب دندانپزشکی تجربی نیز ۵ مطب به صورت تصادفی ساده انتخاب و از هر مطب سه نمونه در انتهای سه روز کاری متواالی (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته) برداشت شد. نمونه‌ها به صورت دستی جداسازی و به ۴۱ جزء مختلف تفکیک و با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی توزین شدند. سپس اجزای توزین شده براساس ویژگی و پتانسیل خطرزایی دسته بنای شدند.

یافته‌ها: میزان کل زباله سالیانه تولیدی در لابراتوارهای دندانسازی و مطب‌های دندانپزشکی تجربی شهر همدان به ترتیب برابر با ۱۵۹۲۱/۷۹ و ۸۶۷۷/۵۶ کیلوگرم می‌باشد. سهم تولید زباله‌های شبے خانگی، بالقوه عفونی، شیمیایی و دارویی و زباله‌های سمی در مطب‌های دندانپزشکی تجربی به ترتیب برابر با ۹۱/۱۴، ۲/۱۴، ۹۱/۱۴، ۰/۰۶ و ۰/۰۰ درصد می‌باشد. در لابراتوارهای دندانسازی زباله‌های تولیدی فقط شامل زباله‌های شبے خانگی (۹۴/۴۷ درصد) و زباله‌های شیمیایی و دارویی (۵۳/۰۶ درصد) می‌باشد و زباله‌های بالقوه عفونی و سمی در آنها تولید نمی‌شود. اجزای اصلی تشکیل دهنده زباله‌های تولیدی در این مراکز شامل ۲ جزء گچ قالب گیری و خمیر قالب گیری می‌شود که در مجموع بیش از ۱۰ درصد زباله را تشکیل می‌دهند. بنابراین جهت انجام برنامه‌های کاهش، جداسازی و بازیافت زباله در مراکز تولید آن می‌باشد بیشترین تمرکز را روی این اجزا داشت.

نتیجه گیری: در رابطه با مدیریت بهینه زباله‌های تولیدی پیشنهاد بر این است که علاوه بر آموزش دندانپزشکان و دندانسازان جهت انجام فعالیت‌های مربوط به کاهش، جداسازی و یا بازیافت زباله در داخل مطب، جمع آوری، حمل و نقل و دفع هر کدام از بخش‌های زباله (زباله‌های سمی، شیمیایی و دارویی، بالقوه عفونی و شبے خانگی) به صورت جداگانه و مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه انجام گیرد.

وازگان کلیدی: زباله‌های شبے خانگی، زباله‌های شیمیایی و دارویی، زباله‌های سمی، زباله‌های لابراتوارهای دندانسازی، زباله‌های مطب‌های دندانپزشکی تجربی

- ۱- دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۲- دکترای بهداشت محیط، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۳- دکترای بهداشت محیط، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
- ۴- دکترای اپیدمیولوژی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۵- دکترای بهداشت محیط، استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

دندانپزشکی در کشور اردن مطالعه‌ای توسط Al-Omari و Al-Dwairi انجام شد^(۵).

نمونه‌های دیگری از زباله‌های خطرناک مراکز دندانپزشکی تجربی و دندانسازی شامل مواد شیمیایی و دارویی و سمی آن می‌باشد. مطبهای دندانپزشکی تجربی و دندانسازی مقدار کمی زباله خطرناک تولید می‌کنند. در سال ۱۹۹۷ در زمینه دفع زباله‌های خطرناک تولیدی در کلینیک‌های دندانپزشکی در نیوزیلند مطالعه‌ای توسط Treasure صورت پذیرفت^(۶). بعضی از انواع زباله‌های خطرناک قابل بازیافت نیز می‌باشند. این اجزا شامل آمالگام، فیلم رادیوگرافی و فویل سربی آن است. آمالگام یک ماده ترمیمی جامد پایدار است که عمدت ترین عناصر تشکیل دهنده آن جیوه و نقره می‌باشد. دیگر اجزای آمالگام شامل ترکیبی از نقره، قلع، مس، روی و فلزات دیگر می‌باشد. بنابراین مهم‌ترین نگرانی در مورد جیوه و نقره آمالگام مطرح می‌باشد زیرا این دو ماده بسیار سمی می‌باشد^(۷).

مبحث مواد زاید تولیدی در مراکز دندانپزشکی و دندانسازی یک موضوع نسبتاً جدید محیط زیستی می‌باشد که در سال‌های اخیر توجه بیشتری به آن معطوف شده است و در این رابطه نیز مطالعات و تحقیقات چندی در کشورهای مختلف دنیا انجام گرفته است. در سال ۱۹۹۷ دانشگاه ملبورن استرالیا در رابطه با وضعیت کلی زباله‌های دندانپزشکی این شهر مطالعاتی انجام داد^(۸). در بانکوک در زمینه دفع زباله‌های دندانپزشکی این شهر یک بررسی اجمالی در سال ۱۹۹۸ توسط Punchanuwat و همکاران صورت پذیرفت^(۹). در سال ۲۰۰۵ در زمینه مدیریت زباله در کلینیک‌های دندانپزشکی کشور برزیل مطالعه‌ای توسط Nazar و همکاران صورت گرفت^(۱۰). در ترکیه در سال ۲۰۰۲ زباله‌های تولیدی کلینیک‌های دندانپزشکی توسط Ozbek و Sanin مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق زباله‌های دندانپزشکی هشت کلینیک در دوروز کاری در ماه‌های آوریل و می نمونه برداری شد. نمونه‌های برداشت شده به صورت دستی جداسازی شدند و اجزای مختلف آن (شیشه،

امروزه یکی از معضلات زیست محیطی، مواد زاید مراکز دندانسازی و دندانپزشکی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا از جمله دارویی و شیمیایی و عفونی از حساسیت خاصی برخوردار است. با وجود این که این مراکز مقادیر نسبتاً کمی زباله تولید می‌کنند اما در دهه گذشته به علت افزایش تعداد ارباب رجوع و بیماران، استفاده از دستکش و سایر وسائل و موادیک بار مصرف باعث افزایش کمیت و تغییر در کیفیت زباله‌های تولیدی شده است. این در حالی است که تاثیرات بسیاری از این مواد بر محیط زیست و بهداشت عمومی هنوز ناشناخته است. زباله‌های مراکز مزبور بطور عام و جزء به جزء می‌توانند شامل اجزای بسیار زیادی باشند. این اجزاء می‌توانند بر اساس جنس، پتانسیل خطرزا، منبع تولید و نحوه مدیریت و سایر پارامترهای موجود دیگر دسته بندی شوند. بطور مثال این نوع زباله‌ها می‌توانند شامل زباله‌های بالقوه عفونی، زباله‌های شبه خانگی، اشیاء تیز و برنده، زباله‌های شیمیایی - دارویی و زباله‌های سمی باشند. زباله‌های شبه خانگی عمدتاً زباله‌هایی می‌شود که حاوی مواد مضر و خطرناک برای سلامت انسان، حیوان و یا محیط زیست نمی‌باشد. زباله‌های شبه خانگی یکی از بخش‌های اصلی زباله‌های دندانپزشکی تجربی و دندانسازی را شامل می‌شود. این بخش از زباله‌ها را می‌توان همراه با سایر زباله‌های معمولی شهری جمع آوری و دفع نمود. همچنین امکان بازیافت این بخش وجود دارد. این اجزا شامل کاغذ، مقوا، پلاستیک، چوب، مواد غذایی، شیشه، فلزات و غیره می‌باشد^{(۱۱) و (۱۲)}.

از بخش‌های مهم زباله‌های دندانپزشکی تجربی زباله‌های عفونی آن می‌باشد که حاوی مواد آلوده شده با خون و دیگر مایعات عفونی دهان و اشیاء تیز و برنده می‌باشد. زباله‌های عفونی به علت دارا بودن عوامل پاتوژن در صورت ورود به محیط باعث ایجاد بیماری در میزان حساس خواهد شد^(۱۳). در سال ۲۰۰۵ در رابطه با کترل عفونت در کلینیک‌های

برداری انتخاب گردید که روزهای شنبه تا چهارشنبه آن تعطیل نباشد تا بین نحو اثر تعطیلی بر میزان تولید زباله به حداقل برسد. نمونه‌ها در بهار سال ۱۳۸۶ برداشت شدند. قبل از انجام نمونه برداری با دندانپزشکان و دندانسازان در خصوص اهداف تحقیق حاضر توجیه شدند. نمونه‌های برداشت شده در پایان ساعت کاری هر مطب بعد از انتقال به یک مکان مناسب مورد آنالیز قرار گرفت. در بخش دیگری از کار با استفاده از یک چک لیست مورد تایید متخصصین وضعیت مدیریت زباله‌های تولیدی در مطب‌های دندانپزشکی تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها حداقل تا ده ساعت بعد از نمونه برداری آنالیز فیزیکی (توزین با استفاده از ترازو) شدند. ترازوی مورد استفاده در این طرح ترازوی آزمایشگاهی مدل Mettler PM ۴۰۰ بود. روش کار به این صورت بود که ابتدا نمونه زباله به صورت دستی به اجزاء تشکیل دهنده آن تفکیک و سپس این اجزاء با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی با دقیقت صدم گرم و تا دو رقم بعد از اعشار بر حسب گرم توزین شدند. در این مطالعه ۴۱ جزء در زباله‌های تولیدی شناسایی و اندازه گیری شد. جهت اینمی بیشتر در هنگام عملیات جداسازی دستی و توزین زباله‌ها از یک دستکش مناسب استفاده شد. هر جزء سه بار وزن شد و در نهایت میانگین به دست آمده برای هر جزء لحاظ شد. عدد به دست آمده بیانگر میزان تولید اجزای مختلف زباله در پایان روز کاری هر مطب یا لبراتور بود. داده‌های خام به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS آنالیز و تحلیل شدند. با معدل گیری از اعداد حاصل از سه روزنمونه برداری از هر مطب میانگین تولید روزانه اجزای مختلف زباله هر مطب تعیین شد. برای مشخص کردن میزان تولید سالیانه زباله در مراکز دندانپزشکی نمونه برداری شده لازم بود که متوسط روزهای کاری سالیانه مراکز یاد شده در نظر گرفته شد. با پرسش از دندانپزشکان در این مورد مشخص شد که تقریباً همه واحدهای یاد شده در روزهای تعطیل کار نمی‌کنند. بنابراین با مراجعه به تعویم، میانگین روزهای کاری، ۲۹۰ روز به دست آمد. با ضرب کردن

کاغذ، دستکش، مواد غذایی و...) مورد آنالیز فیزیکی (توزین با استفاده از ترازو) قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که مهم ترین جزء تشکیل دهنده زباله‌های مذکور، مربوط به دستکش‌های دندانپزشکی بود که در حدود ۳۵ درصد وزنی زباله‌ها را به خود اختصاص می‌داد. دیگر اجزای اصلی زباله شامل کاغذ، شیشه و پلاستیک بود(۱۱). دریوانان نیز در سال ۲۰۰۲ مطالعه مشابهی توسط Kizlary Elly و همکاران انجام شد. در این مطالعه زباله‌های ۲۳ مطب دندانپزشکی به مدت ۲۲ روز مورد نمونه برداری و آنالیز قرار گرفت(۱۲). در ایران هنوز در رابطه با زباله‌های دندانپزشکی مطالعه‌ای انجام نشده است و تحقیق حاضر به عنوان اولین مورد، با هدف آنالیز کمی و کیفی و بررسی مدیریت زباله‌های دندانپزشکی در شهر همدان انجام شد.

مواد و روش‌ها

محل نمونه برداری و اجرای طرح توصیفی حاضر شهر همدان بود. استان همدان در غرب ایران بین بخشی از رشته کوه زاگرس میانی و فلات مرکزی ایران قرار گرفته است. شهرستان همدان با جمعیت معادل ۴۳۰۰۰ نفر بزرگترین شهرستان این استان است. مراکز تولید زباله شهر همدان که مورد نمونه برداری و آنالیز قرار گرفته شامل لبراتورهای دندانسازی و مطب‌های دندانپزشکی تجربی (بهداشت کاران دهان و دندان) بود.

شهر همدان در مجموع دارای ۲۷ مطب دندانپزشکی تجربی و ۲۴ لبراتور دندانسازی می‌باشد. ۵ مطب دندانپزشکی تجربی و ۵ مطب و لبراتور دندانسازی (در مجموع ۱۰ مطب) به عنوان مکان‌های نمونه برداری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. از هر کدام از این ۱۰ مطب سه مورد نمونه برداری انجام گرفت. بنابر این در مجموع تعداد کل نمونه‌های مورد آنالیز ۳۰ عدد بود. هر نمونه در انتهای روز کاری هر مطب برداشت می‌شد. سه نمونه هر مطب در سه روز متوالی (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) هر هفته انتخاب شد. هفته‌هایی برای نمونه

زباله های شیمیایی و دارویی: آمپول مصرف شده، خمیر قالب گیری

نتایج

میزان و درصد تولید بخش های مختلف زباله در لابراتوارهای دندانسازی و مطب های دندانپزشکی تجربی شهر همدان در جداول شماره ۱ و ۲ نشان داده شده است. میزان کل زباله سالیانه تولیدی در لابراتوارهای دندانسازی و مطب های دندانپزشکی تجربی به ترتیب برابر با $۸۶۷۷/۵۶$ و $۱۵۹۲۱/۷۹$ کیلوگرم می باشد. بخش های تشکیل دهنده زباله مطب های دندانپزشکی تجربی شامل زباله های شبه خانگی ($۹۱/۱۴$ درصد)، زباله های شیمیایی و دارویی ($۶۷/۶$ درصد)، زباله های بالقوه عفونی ($۲/۱۴$ درصد) و زباله های سمی ($۰/۰۲$ درصد) می باشد.

جدول ۱: میزان و درصد تولید بخش های مختلف زباله در لابراتوارهای دندانسازی شهر همدان

نوع (بخش) زباله	مقدار (کیلوگرم در سال)	درصد
زباله های شبه خانگی	$۱۵۰۴۱/۴۶$	$۹۴/۴۷$
زباله های بالقوه عفونی	.	$۰/۰۲$
زباله های شیمیایی و دارویی	$۸۸۰/۳۲$	$۵/۵۳$
زباله های سمی	.	.
میزان کل	$۱۵۹۲۱/۷۹$	۱۰۰

جدول ۲: میزان و درصد تولید بخش های مختلف زباله در مطب های دندانپزشکی تجربی شهر همدان

نوع (بخش) زباله	مقدار (کیلوگرم در سال)	درصد
زباله های شبه خانگی	$۷۹۰۹/۰۴$	$۹۱/۱۴$
زباله های بالقوه عفونی	$۱۸۵/۸$	$۲/۱۴$
زباله های شیمیایی و دارویی	$۵۸۱/۰۸$	$۶/۷$
زباله های سمی	$۱/۶۴$	$۰/۰۲$
میزان کل	$۸۶۷۷/۵۶$	۱۰۰

از سوی دیگر زباله های لابراتوارهای دندانسازی تنها متشکل از دو بخش شبه خانگی ($۹۴/۴۷$ درصد) و شیمیایی

میانگین تولید روزانه اجزای مختلف زباله در عدد مذکور، میزان تولید سالیانه اجزای مختلف زباله در مراکز دندانپزشکی نمونه برداری شده به دست آمد. پس از آن مقادیر به دست آمده به کل جامعه (شهر همدان) تعمیم داده شد. با تقسیم تعداد کل واحدهای دندانپزشکی موجود در شهر بر تعداد مطب های نمونه برداری ضرایب $۴/۸$ و $۵/۴$ به ترتیب برای مطب های دندانپزشکی تجربی و لابراتوارهای دندانسازی به دست آمد. با ضرب کردن این ضریب در میزان تولید سالیانه اجزای مختلف زباله در مراکز دندانپزشکی نمونه برداری شده، میزان کل تولید سالیانه زباله در کل لابراتوارهای دندانسازی و مطب های دندانپزشکی های تجربی شهر همدان به دست آمد و نمودارها و نتیجه گیری های انجام گرفته بر پایه این اعداد انجام شدند. ۴۱ جزء زباله توزین شده بر اساس اهمیت زیست محیطی و پتانسیل خطر زایی و با در نظر گرفتن تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی از زباله های بیمارستانی در چهار دسته زباله های شبه خانگی، زباله های بالقوه عفونی، زباله های شیمیایی و دارویی و زباله های سمی به صورت زیر تقسیم بندی شدند:

زباله های شبه خانگی: دستمال کاغذی خشک، پنبه خشک، پوشش بسته بندی سرنگ و سوزن، کاغذ، کارتن و مقوا، روزنامه، پارچه، کپسول خالی آمالگام، لیوان یک بار مصرف، لاستیک، گچ قالب گیری، نوار چسب کاغذی، نوار چسب شیشه ای، چوب کبریت، پوشش بسته بندی مواد غذایی، چای، پوشش بسته بندی آمپول، نایلون، پلاستیک، کاغذ کاربن، ماسک، مخلوط خاک و گچ، مواد غذایی

زباله های عفونی وبالقوه عفونی: دستمال کاغذی آلوده به خون، دستمال کاغذی آلوده به بzac، پنبه آلوده به بzac، آلووده به خون، دنتال رول آلوده به بzac، دستکش نایلونی، دستکش لاتکسی، سوزن و اشیا تیز و برنده، دندان کشیده شده، آینه دندانپزشکی، سرنگ پلاستیکی، چوب دهان

زباله های سمی: دستمال کاغذی آلوده به آمالگام، ذرات آمالگام، پوشش سربی فیلم رادیوگرافی

را شامل می شود. بعد از آن خمیر قالب گیری (از نوع شیمیایی و دارویی) می باشد که جهت مدیریت بهینه زباله های مذکور لازم است از گچ قالب گیری جدا شود. از جدول شماره ۵ چنین استنباط می شود که اجزای تشکیل دهنده زباله های بالقوه عفونی مراکز دندانپزشکی تجربی تنها شامل ۱۲ جزء می باشد که با جداسازی این ۱۲ جزء می توان زباله های بالقوه عفونی را از جریان مواد زاید تولیدی مطب های دندانپزشکی تجربی خارج نمود.

و دارویی (۵/۵۳) می باشد و مشاهده شد که زباله های سمی و بالقوه عفونی در آن وجود ندارد. در جداول ۳ تا ۵ میزان و درصد اجزای اصلی زباله های تولیدی نشان داده شده است که بر اساس آن می توان برنامه های مربوط به کاهش تولید، جداسازی، تفکیک و بازیافت را بر روی این اجزا مرکز نمود. جزء اصلی زباله تولیدی مربوط به گچ قالب گیری (از نوع شبه خانگی) می باشد که به ترتیب ۸۳ و ۹۰ درصد زباله های دندانپزشکی تجربی و لابراتوارهای دندانسازی

جدول ۳: میزان تولید اجزای مختلف زباله در لابراتوارهای دندانسازی شهر همدان

جزء زباله توزین شده	مقدار (کیلوگرم در سال)	درصد	درصد تجمعی
گچ قالب گیری	۱۴۳۲۹/۷۶	۹۰	۹۰
خمیر قالب گیری	۶۷۷/۳۰	۴/۲۵	۹۴/۲۵
سایر اجزاء	۹۱۴/۷۳	۵/۷۵	۱۰۰
مجموع	۱۵۹۲۱/۷۹	۱۰۰	

جدول ۴: میزان تولید اجزای مختلف زباله در مطب های دندانپزشکی تجربی شهر همدان

جزء زباله توزین شده	مقدار (کیلوگرم در سال)	درصد	درصد تجمعی
گچ قالب گیری	۷۲۰۶/۳۹	۸۳/۰۵	۸۳/۰۵
خمیر قالب گیری	۴۴۴/۹۷	۵/۱۳	۸۸/۱۷
نایلون	۱۳۰/۱۱	۱/۵۰	۸۹/۹۷
مخلوط خاک و گچ	۱۲۸/۳۰	۱/۴۸	۹۱/۱۵
دستمال کاغذی خشک	۸۷/۸۸	۱/۰۱	۹۲/۱۶
سایر اجزاء	۶۷۹/۹۱	۷/۸۴	۱۰۰
مجموع	۸۶۷۷/۵۶	۱۰۰	

این ماده خطرناک و سمی همراه با زباله های تولیدی دفع شود. Safety Box جهت جمع آوری و دفع جداگانه اشیاء تیز و برنده نیز هنوز مورد استفاده نمی باشد و در بسیاری از موارد بخش مذکور همراه با دیگر زباله های تولیدی دفع می شود. تولید زباله در این مراکز هم زمان با شروع به کار آنها در صبح شروع و در انتهای شیفت کاری عصر نیز پایان می گیرد. زباله های تولید شده در داخل سطل های پلاستیکی و یا

مهم ترین نتایج حاصل از چک لیست استفاده شده جهت بررسی نحوه مدیریت زباله های دندانپزشکی تجربی در جدول ۶ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود فعالیت مثبت و مفیدی در مراکز دندانپزشکی تجربی در خصوص اجرای برنامه های کاهش تولید، تفکیک و بازیافت زباله های تولیدی صورت نمی گیرد. مدیریت نامناسب و عدم بازیافت آمالگام استفاده شده در مراکز دندانپزشکی تجربی باعث شده است که

جدول ۵: میزان تولید اجزای مختلف زباله های عفونی در مطب های دندانپزشکی تجربی شهر همدان

جزء زباله توزین شده	مقدار (کیلوگرم در سال)	درصد	درصد تجمعی
دندان کشیده شده	۵۰/۹۸	۲۷/۴۴	۲۷/۴۴
دستکش لا تکسی	۳۴/۶۲	۱۸/۶۴	۴۶/۰۸
سرنگ پلاستیکی	۲۰/۳۵	۱۰/۹۵	۵۷/۰۳
پنبه آلوده به خون	۱۸/۴۳	۹/۹۱	۶۶/۹۵
دستمال کاغذی آلوده به خون	۱۷/۳۵	۹/۳۴	۷۶/۲۸
سوzen و اشیا تیز و برنده	۱۵/۶۴	۸/۴۲	۸۴/۷۰
چوب دهان	۱۵/۰۸	۸/۱۲	۹۲/۸۲
دنتال رول آلوده به براق	۴/۰۶	۲/۱۸	۹۵
آینه دندانپزشکی	۳/۸۷	۲/۰۸	۹۷/۰۸
دستمال کاغذی آلوده به براق	۲/۹۱	۱/۰۷	۹۸/۶۵
پنبه آلوده به براق	۲/۰۳	۱/۰۹	۹۹/۷۴
دستکش نایلونی	۰/۴۸	۰/۲۶	۱۰۰
مجموع	۱۸۵/۸۰	۱۰۰	

جدول ۶: نحوه مدیریت زباله های تولیدی در مراکز دندانپزشکی تجربی

نوع فعالیت	نتایج
وجود برنامه کاهش تولید زباله	۱۰۰ درصد خیر
وجود برنامه تفكیک زباله	۱۰۰ درصد خیر
وجود برنامه بازیافت زباله	۱۰۰ درصد خیر
وجود واحد بازیابی نقره	۱۰۰ درصد خیر
وجود Mercury spill kit	۱۰۰ درصد خیر
وجود فیلتر آمالگام در یونیت دندانپزشکی	۱۰۰ درصد خیر
روش مدیریت آمالگام اضافی	۱۰۰ درصد ورود مستقیم به دستشویی و سیستم فاضلابرو
روش مدیریت ذرات آمالگام کنده شده از دندان بیمار	۱۰۰ درصد ذرات ریز درون یونیت و ذرات ریز درون سطل زباله
مدیریت کپسول های خالی آمالگام	۱۰۰ درصد دفع در سطل زباله
روش مدیریت اشیاء تیز و برنده	۱۰۰ درصد دفع مستقیم در سطل زباله
روش مورد استفاده جهت استریل وسایل و ابزار دندانپزشکی	۶۰ درصد فور و محلول های گندزدا ۲۰ درصد اتوکلاو و فور، ۲۰ درصد فور

به بخش شبه خانگی آن می‌باشد. در مطالعه مشابه انجام گرفته در یونان مشخص شد که ۹۴/۷ درصد از کل زباله تولیدی مربوط به زباله‌های عفونی و بالقوه عفونی بود و سهم زباله‌های شبه خانگی و زباله‌های غیر عفونی نیز به ترتیب برابر با ۳/۳ و ۲ درصد بود(۱۲). علت وجود این اختلاف عمده در میزان زباله‌های عفونی و شبه خانگی در یونان با تحقیق حاضر در این است که محیط نمونه برداری در مطالعه انجام شده در یونان شامل کلینیک‌های دندانپزشکی می‌باشد که بیشتر کارهای درمانی و ترمیمی بیماران را انجام می‌دهند. بنابراین بیشتر زباله‌های تولیدی از نوع عفونی می‌باشد، در حالی که در دندانپزشکی تجربی میزان زباله عفونی تولیدی کم و در لابراتوارهای دندانسازی نیز به لحاظ نوع کار هیچ نوع زباله عفونی تولید نمی‌شود. زباله‌های شبه خانگی حاوی اجزای قابل بازیافتی چون کاغذ، کارتن و مقوای پلاستیک و نایلون، شیشه و غیره می‌باشد، ضمن اینکه می‌توان آن را همراه با زباله‌های شهری جمع آوری و دفع نمود. بخش دیگری که در زباله‌های مراکز دندانپزشکی تجربی وجود داشت زباله‌های بالقوه عفونی است که شاید مهم ترین نگرانی در رابطه با این بخش وجود دارد زیرا در صورت عدم مدیریت مناسب آنها ممکن است باعث انتشار عوامل بیماری زا در محیط زیست شود. این گونه زباله‌ها را می‌بایست بطور مجرزا جمع آوری و قبل از دفع، آن‌ها را استریل و یا اتو کلاو نمود. Ozbek و Sanin در ترکیه با جداسازی و استریل دستکش‌های مورد استفاده توسط دندانپزشکان از جریان زباله‌های تولیدی توانستند حجم زباله‌های بالقوه عفونی را به میزان ۳۵ درصد کاهش دهنند(۱۱). دسته سوم و چهارم زباله‌های تولیدی شامل زباله‌های شیمیایی و دارویی و زباله‌های سمی می‌باشند. این دو بخش حاوی عناصر و مواد شیمیایی و سمی می‌باشد که در عین حال بعضی از اجزای آن همچون ذرات آمالگام و فویل سربی پوشش فیلم رادیوگرافی قابل بازیافت هستند. در مجموع می‌توان گفت که می‌بایست این دو بخش از زباله‌ها را به طور خاص و براساس خصوصیات آن‌ها و بعضًا به عنوان

فلزی دارای کیسه‌های نایلونی ریخته می‌شوند و تا هنگام پرسدن آنها و در انتهای شیفت کاری عصر در داخل مطب نگهداری می‌شود. در پایان روز کاری مطب که به طور معمول حدود ساعت ۲۰-۲۲ عصر می‌باشد کیسه نایلونی پرسدene به جلو درب مطب در کنار خیابان انتقال داده می‌شود تا توسط مامورین شهرداری جمع آوری شود. جمع آوری زباله‌های خانگی در شهر همدان از ساعت ۱۷ عصر شروع و تا ۲۴ ادامه می‌یابد. به علت این هم زمانی در تولید زباله‌ها با جمع آوری زباله‌های خانگی توسط شهرداری، زباله‌های تولید شده در مراکز دندانپزشکی تجربی و دندانسازی مذکور شهر همدان همراه با زباله‌های خانگی جمع آوری و دفن می‌شود.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج ارایه شده در قسمت‌های قبل مشاهده شد که میزان کل زباله‌های تولیدی در مراکز دندانسازی و دندانپزشکی تجربی شهر همدان در مجموع بیش از ۲۴ تن در سال می‌باشد. این عدد اگر چه در مقایسه با زباله‌های شهری تولیدی در همدان کوچک به نظر می‌رسد، اما با توجه به وجود اجزای بالقوه عفونی، شیمیایی و دارویی و سمی در این نوع زباله‌ها می‌بایست نسبت به مدیریت مناسب آن توجه به وجود اجزای برای مدیریت بهینه زباله‌های تولیدی می‌بایست برنامه‌های کاهش تولید زباله، جداسازی و بازیافت و استفاده مجدد را تحد امکان اجرا نمود. برنامه کاهش تولید زباله از طریق کاهش استفاده از مواد یک بار مصرف واستفاده از مواد و محصولات با پتانسیل خطرزایی کمتر و با بسته بندی کوچکتر قابل انجام می‌باشد. همچنین لازم است که از مخلوط شدن تمام اجزای زباله‌ها با یکدیگر جلوگیری به عمل آورد. اجزا و ترکیبات این نوع زباله‌ها خصوصیات متفاوتی با هم دارند که روش مدیریت هر کدام نیز می‌بایست بر اساس این خصوصیات استوار باشد و جمع آوری و دفع آنها به صورت مخلوط و یکجا کار چندان اصولی و مناسبی به نظر نمی‌رسد. همان طور که محاسبات نشان دادند بخش اصلی زباله‌های تولیدی مربوط

تشکر و قدردانی

شایسته است که از آقایان دکتر حیدریان، دکتر صالحی، و مهندس بینوپور که در انجام این تحقیق ما یاری دادند تشکر و قدردانی به عمل آید.

ماده خطرناک جمع آوری و دفع نمود.

نتیجه آن که در رابطه با مدیریت بهینه زباله های دندانپزشکی پیشنهاد بر این است که علاوه بر آموزش دندانپزشکان و دندانسازان جهت انجام فعالیت های مربوط به کاهش، جداسازی و یا بازیافت زباله در داخل مطب، جمع آوری، حمل و نقل و دفع هر کدام از بخش های زباله های (زباله های شبکه خانگی، بالقوه عفونی، شیمیایی و دارویی و سمی) به صورت جداگانه و مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط موجود انجام گیرد.

منابع

1. Arenholt-Bindsler D. Environmental aspect of dental filling material. Eur J Oral Sci. 1998;106: 713-720.
2. LaGrega M., Buckingham P, Evans J. Hazardous waste management. second ed, McGraw Hill, New York. 2001.
3. Fan PL, McGill SL. How much waste do dentists generate? Journal of califirnia Dental Association. 1989 ; 17(12): 39-40.
4. Prüss A, Giroult E, Rushbrook P. Safe management of waste from health-care activities. WHO, Geneva p 2. chapter 2. 1999.
5. Al-Omari MA, Al-Dwairi ZN. Compliance with Infection Control Programs in Private Dental Clinics in Jordan. Journal of Education. 2005; 69: 693-701.
6. Treasure ET, Treasure P. An Investigation of The Disposal of Hazardous Waste From New Zealand Dental Practices. Community Dental Oral Epidemiology. 1997; 25(4): 328-331.
7. Trip L. A pollution prevention program for dental amalgam waste. Journal of Canadian Dental Association. 2001; 67(5): 270-273.
8. Farmer GM, Stankiewicz N, Michael B, Wojcik A, Lim Y, Ivkovic D, Rajakulendran J, Audit of Waste Collected Over One Week from Ten Dental Practices. Australian Dentist Journal. 1997; 42(2):114-117.
9. Punchantwat K, Drummond BK, Treasure ET. An Investigation of the Disposal of Dental Clinical Waste in Bangkok. International dental Journal. 1998; 48(4): 369-373.

10. Nazar MW, Pordeus IA, Werneck MA. Dental Waste Management in Municipal Health Clinics in Belo Horizonte, Brazil. Rev Panam Salud Publica. 2005; 17(4): 237-42.
11. Sanin D and Ozbek M. A study of the dental solid waste produced in a school of dentistry in turkey. waste management. 2004; 24(4): 339-345.
12. Kizlary E, Iosifidis N, Voudrias E, Panagiotakopoulos D. Composition and production rate of dental solid waste in Xanthi,Greece. waste management. 2005; 25(6): 582-591.

Quantity and Quality Analysis and Management of Solid Waste Produced in Dentistry Laboratories and Practical Dentist Offices in Hamedan, 1386

***Kulivand A., Nabizadeh R., Joneidy A., Younesian M., Omrany Gh.**

Department Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received 17 Mars 2009; Accepted 19 May 2009

ABSTRACT

Backgrounds and Objectives: Today, One of the most important environmental issues is solid waste Produced in Dentistry That because of the presence of hazardous, toxic and pathogen agents has special importance. In this survey, solid waste produced in Hamadan Dentistry laboratories and practical dentist offices is studied.

Materials and Methods: In this descriptive study, from 24 Dentistry laboratories in Hamedan 5 offices and from 27 practical dentist offices 5 offices were selected in simple random way. From each offices 3 sample at the end of successive working day (Sunday, Monday and Tuesday) were analyzed. Samples were manually sorted into different 41 components and by means of laboratory scale were measured. Then, measured components were classified based on characteristic and hazardous potential.

Results: Total annual waste produced in Dentistry laboratories and practical dentist offices in Hamaden is 15921.79 and 8677.56 Kg respectively. Production percentages of domestic type, chemical and pharmaceutical waste, potentially infectious and toxic wastes in practical dentist offices were 91.14, 6.7, 2.14 and 0.02 respectively. Dentistry laboratories solid waste comprises of 94.47 percent domestic type and 5.53 percent chemical and pharmaceutical waste. Main components of produced analyzed wastes were 2 components that consist of more than 80 percents of total dental solid waste. So, waste reduction, separation and recycling plans in the offices must be concentrated on these main components.

Conclusion: In order to waste suitable management, it is suggested that in addition to educate waste producer for waste reduction, separation and recycling in the offices, each section of dental waste (toxic, chemical and pharmaceutical, potentially infectious and domestic type wastes) separately and according to related criteria are managed.

Keywords: potentially infectious wastes, domestic type wastes, chemical and pharmaceutical wastes, toxic wastes, Dentistry laboratories wastes, practical dentist wastes

*Corresponding Author: *akulivand@yahoo.com*
Tel: +98 160 9434 917 Fax: +98 21 88950188